

administración inmunoterapia

@Creative_Nurse

el antes y después de administrar una dosis

ANTES

Si el paciente presenta:

- ⚠ Infección respiratoria, asma inestable...
- ⚠ Enfermedad infecciosa o febril

ESPERAR HASTA SU RESOLUCIÓN

Si ha recibido una vacuna de VIRUS VIVOS en los últimos días

ESPERAR 10 DÍAS PARA ADMINISTRAR INMUNOTERAPIA

- ✓ Control de la **TOLERANCIA** de la dosis anterior
- ✓ Control del **TIEMPO TRANSCURRIDO** desde la última dosis administrada

DESPUES

ANOTAR SIEMPRE

- Fecha de la dosis
- Cantidad administrada
- Brazo donde se aplicó

Siempre permanecer 30 minutos de **OBSERVACIÓN**



RECORDAR AL PACIENTE:

- Evitar ejercicio físico, sauna o baño con agua caliente en las próximas 3 horas.
- Evitar el rascado de la piel.
- Aplicación de hielo local si presenta enrojecimiento y prurito y tomar antihistamínico pautado.
- Consultar con su profesional si presenta reacción local superior a 5 cm de diámetro.

ADMINISTRACIÓN

1



LAVADO DE MANOS

2

COMPROBAR EN LA VACUNA
Nombre del paciente
Fecha de Caducidad
Composición



3



Selección del vial correspondiente
AGITARLO SUAVEMENTE
Extraer **DOSIS CORRECTA**

4

Alternar los brazos en las respectivas administraciones

5

Desinfectar la zona de punción




6

Cara externa del brazo en el **PUNTO MEDIO ENTRE EL HOMBRO y el CODO** (1/3 medio) y en la misma línea de éste



7

Vía subcutánea profunda, formando un **ÁNGULO DE 45°**



8

Aspirar lentamente. Inyectar muy **LENTAMENTE** el extracto, una vez introducido, esperar 5 segundos y retirar aguja




9

Tras la inyección, presionar suavemente el punto de aplicación, **SIN FROTAR NI REALIZAR MASAJE EN LA ZONA**

DUDAS FRECUENTES

Si se pueden mezclar dos viales para reconstruir una dosis, siempre que sea la misma vacuna, la misma composición, concentración y no estén caducados.



EMBARAZO: No iniciar inmunoterapia. Continuar con la inmunoterapia si está en fase de mantenimiento y es bien tolerada.

Deben conservarse en nevera, **NO CONGELAR**. No es perjudicial a temperatura ambiente durante cortos periodos de tiempo.



NUNCA REDUCIR LA DOSIS, si no es por orden del especialista.

REAJUSTE DE PAUTA

★ Consideramos interrupción de la vacuna desde la fecha en la que le tocaba administrar la dosis

DURANTE EL PERÍODO DE **INICIACIÓN** SEMANAL



Igual pauta



Repetir última dosis tolerada



Reducir en 0,2 ml la dosis por cada semana de retraso

DURANTE EL PERÍODO DE **MANTENIMIENTO** MENSUAL



Repetir última dosis tolerada



Consultar con el médico especialista

Para más información escanea el Código QR y consulta el "Manual de Inmunoterapia"
http://aveaenfermeria.es/wp-content/uploads/2017/06/170603_manual-de-inmunoterapiainologo.pdf

avea

ASOCIACIÓN VALENCIANA DE ENFERMERÍA DE ALERGIA