




revisa EL PROTOCOLO DE TU CENTRO DE TRABAJO

@Creative\_nurse

# crisis convulsivas en niños

## ESTABILIZACIÓN

- A VÍA AÉREA
- B VENTILACIÓN
- C CIRCULACIÓN



**Mantener en decúbito lateral** (si no existe traumatismo previo)  
Aspirar secreciones  
Poner cánula orofaríngea




**Administrar O<sub>2</sub> al 100%** (Mascarilla reservorio, intubación)  
Valorar: color, movimientos tórax, FR, auscultación pulmonar, saturación de oxígeno




**Canalizar vía IV** >>> **Suero Glucosado al 5%**  
Valorar: perfusión periférica, pulsos, FC, tensión arterial

## GLUCEMIA + ANALÍTICA


Tira reactiva para conocer la glucemia  
Extraer sangre para determinación de electrolitos, pH, gases, bicarbonato, urea, creatinina, niveles de anticonvulsivantes



**Si HIPOGLUCEMIA**  
suero glucosado 25% (2 ml/kg) **IV**



## MEDICACIÓN ANTICONVULSIVA



A PARTIR DE ESTE TIEMPO SE CONSIDERA ESTATUS EPILÉPTICO >>> INDUCCIÓN DE COMA BARBITÚRICO