


# BUCCOLAM®

MIDAZOLAM SOLUCIÓN BUCAL


@CREATIVE\_NURSE

## PRINCIPIO ACTIVO

El **MIDAZOLAM** pertenece a un grupo de medicamentos conocidos como **BENZODIAZEPINAS**.



## ADMINISTRACIÓN POR VÍA ORAL



Insertar la punta de la jeringa entre la encía inferior y la mejilla. Liberar lentamente la solución presionando suavemente el émbolo hasta que se vacíe.

## INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Tratamiento de las **CRISIS CONVULSIVAS** agudas y prolongadas en lactantes, niños y adolescentes (de 3 meses a <18 años).

## POSOLÓGIA

Rango de EDAD:  
3 a 6 meses (ámbito hospitalario)\*  
> 6 meses a < 1 año

\*En lactantes de entre 3-6 meses de edad, el tratamiento se debe administrar en un hospital en el que se pueda monitorizar al paciente y que cuente con equipo de reanimación.




Rango de EDAD:  
1 año a < 5 años



Rango de EDAD:  
5 años a < 10 años




Rango de EDAD:  
10 años a < 18 años



No se deben acoplar a la jeringa para uso oral:  
Agujas, cánulas intravenosas o cualquier otro dispositivo para administración parenteral.

BUCCOLAM® no se debe administrar por vía intravenosa.



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LA FICHA TÉCNICA

